

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: RAKER OD es un producto en base a Tolpyralate, el cual pertenece al grupo químico de los Benzoil pirazole.

Utilizar normas estrictas de higiene, evitar tomar contacto con el producto. No botar desechos en sistemas de drenaje. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel y la contaminación de los alimentos.

Durante la preparación: usar guantes impermeables, antiparras, máscara con filtro, overol impermeable y botas de goma. **Durante la aplicación:** usar antiparras, máscara con filtro, overol impermeable, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua las partes del cuerpo o ropa que pueden haber tenido contacto con el producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco.

Información Ecotoxicológica: RAKER OD es ligeramente tóxico para abejas, no tóxico para aves, prácticamente no tóxico para peces ni microcrustáceos.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

Instrucciones de Triple Lavado:

Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total.

Paso 2: Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar.

Paso 3: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente se debe perforar el envase una vez terminado el triple lavado para evitar su reutilización y proceder según legislación nacional.

Síntomas de Intoxicación: Los síntomas más comunes que se esperan son dolor de cabeza, diarrea, dolor de estómago, náuseas y mareos.

PRIMEROS AUXILIOS:

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si la irritación persiste contacte un médico

CONTACTO CON LA PIEL: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volverla a usar. Si la irritación persiste contacte un médico.

INHALACIÓN: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

INGESTIÓN: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de soporte.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Teléfonos de Emergencia: RITA_CHILE: 22777 1994.

RAKER OD

**HERBICIDA
DISPERSIÓN OLEOSA (OD)**

RAKER OD Herbicida de post emergencia temprana con acción sistémica de absorción foliar para el control de malezas en cultivo de maíz indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

Tolpyralate*.....10% p/v (100 g/l)
Coformulantes, c.s.p.....100% p/v (1 l)

*(RS)-1-(1-etil-4-[4-metil-3-(2-metoxietoxi)-o-toluoil]pirazol-5-iloxi)etil metil carbonato

**Autorización Servicio Agrícola y Ganadero
Nº3.648**

**<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO>>**

Lote Nº:

Fecha Fabricación: (mes y año)

Fecha Vencimiento:

Contenido Neto:

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Fabricado por:

ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku

Osaka 550-0002.

Japón

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO

RAKER OD Herbicida de post emergencia temprana de acción sistémica de absorción foliar para el control de malezas en cultivo de maíz indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Maíces chocleros y de grano	Especies latifoliadas. Anuales. Amor seco <i>Bidens pilosa</i> Buglosa <i>Picris echioides</i> * Chamico (<i>Datura stramonium</i> , <i>D. ferox</i>) Clonqui <i>Xanthium spinosum</i> Malvilla <i>Anoda cristata</i> Mostacilla <i>Sisymbrium officinale</i> * Quinhuilla <i>Chenopodium album</i> , <i>Chenopodium murale</i> * Rábano <i>Raphanus sativus</i> * Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Yuyo <i>Brassica campestris</i> * Especies gramíneas. Anuales. Hualcacho <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>E. oryzoides</i> * Panicum <i>Panicum capillare</i> , Pata de gallina <i>Digitaria sanguinalis</i> , Poa <i>Poa annua</i> Pegapega <i>Setaria verticillata</i> ,* Setaria <i>Setaria viridis</i> , Perennes. Chépica <i>Paspalum paspalodes</i> Maicillo <i>Sorghum halepense</i> # Pasto bermuda <i>Cynodon dactylon</i> #	300 – 400 ml/ha	Aplicar de post emergencia de malezas y con un desarrollo del maíz entre 2 y 6 hojas verdaderas. Los mejores niveles de control se alcanzan con malezas al estado de 2 a 4 hojas de desarrollo. Usar la concentración más alta en malezas de mayor desarrollo, en especies perennes, bianuales y/o anuales con mayor capacidad de rebrote (raíz pivotante ya formada). Se recomienda usar un volumen de agua entre 150 a 200 L/ha.

* = malezas anuales con alta capacidad de rebrote.

= malezas perennes con mayor dificultad de control.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada de **RAKER OD**, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando. En el caso de usar mezclas con otros herbicidas, repetir lo anterior agregando el segundo herbicida antes del completo llenado del estanque.

RAKER OD debe ser aplicado inmediatamente o dentro de las 12 horas de preparada la mezcla, mojado completamente las hojas y tallos de las malezas. Aplicar con equipos terrestres convencionales de pulverización de herbicidas hidroneumáticos (pulverizadoras mecánicas o manuales) cuyas barras estén provistas de boquillas antideriva de abanico plano.

La aplicación terrestre se debe realizar con volúmenes de agua de 150 a 200 L/ha. Con equipos hidroneumáticos se recomienda emplear una presión de trabajo de 30 a 40 libras/pulg2 (2 a 2,75 bares).

Incompatibilidad: Incompatible con productos de marcada reacción alcalina y materiales ácidos u oxidantes.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

Periodo de Carencia: 35 días.

Tiempo de Reingreso: 12 Horas para personas. No permitir el reingreso de animales de pastoreo al área tratada hasta 21 días después de la aplicación.

Nota: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo con su recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su uso inadecuado ya sea por mal manejo del almacenamiento y/o mala manipulación de los envases y/o trasvasajes.

