



We create chemistry

# Ventur<sup>®</sup>

## Fungicida Suspensión Concentrada (SC)

Fungicida formulado a base de dos materias activas, epoxiconazol y boscalid, con acción preventiva, curativa y erradicante, con prolongada persistencia de acción, altamente eficaz para el control de las enfermedades y en los cultivos mencionados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### Composición:

Epoxiconazol*	6,7% p/v (67 g/L)
Boscalid**	23,3% p/v (233 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100% p/v (1 L)

\* (2*RS*, 3*SR*)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1*H*-1,2,4-triazol

\*\* 2-cloro-*N*-(4'-clorobifenil-2-il)-nicotinamida

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2651

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: ..... Litros

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

**BASF Española**

Ctra Nacional 340 Km 1156,

43006 Tarragona, España

Importado y Distribuido por:

**BASF Chile S.A.**

Carrascal 3851 - Casilla 3238

Fono: (56) 22640 7000

Santiago - Chile

Representante en Chile de BASF S E

© Marca Registrada BASF



**CUIDADO**



# Ventur®

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Epoxiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles y Boscalid pertenece al grupo químico de las piridincarboximidias.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, cabeza, ojos y ropa.
- Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza impermeable.
- Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, overol impermeable, antiparras, máscara con filtro y protección de cabeza impermeable.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separada de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**Síntomas de intoxicación:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

### Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar al médico si es necesario.
- **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Dejarlo en reposo. Si no respira proporcionar respiración artificial. Llamar al médico.
- **Ingestión:** no inducir el vómito a menos que sea bajo supervisión médica. Nunca dar nada por la boca si el afectado está inconsciente. Acudir al médico o Centro Asistencial inmediatamente para tratamiento inmediato.

**Tratamiento médico de emergencia:** Mantener funciones vitales y realizar tratamiento sintomático y de sostén.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

**Riesgos ambientales:** Ventur® en condiciones normales de uso, es no tóxico para abejas y aves. Es tóxico a peces, no contamine cursos de agua. Epoxiconazol y Boscalid son tóxicos para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

"EPOXICONAZOL ES SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR CÁNCER Y PUEDE PERJUDICAR LA FERTILIDAD O DAÑAR AL FETO." "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

### Procedimiento para el triple lavado:

1. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces.
2. Perfore el envase para evitar su reutilización.

**Teléfonos de emergencia:** BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (**Atención las 24 horas**). CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600.

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

ABRA AQUÍ - Instrucciones de Uso al Reverso

SAG MAY/2023-2 - D.A.C. MAY/2023 - 4



**CUIDADO**



# Ventur®

## INSTRUCCIONES DE USO

### Generalidades

Ventur® fungicida con acción preventiva, curativa y erradicante, con prolongada persistencia de acción, altamente eficaz para el control de las enfermedades y en los cultivos mencionados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

## CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

### APLICACIONES TERRESTRES Y/O AEREAS

Cultivos	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigo (blanco y candeal)	Mancha ocular ( <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> ), Septorioxis ( <i>Septoria tritici</i> ) Royas o polvillos ( <i>Puccinia striiformis</i> , <i>P. recóndita</i> , <i>P. graminis</i> ) Oídio ( <i>Blumeria graminis</i> )	1,5 L/ha	Aplicar <b>Ventur</b> , de preferencia, en forma preventiva a fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga recién expuesta. Evite aplicar con tiempo muy caluroso (temperatura igual o superior a 30° C). En aplicaciones terrestres aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 100 - 200 L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 50 L de agua/ha Aplicaciones por temporada: máximo dos.
Avena, Cebada	Royas o polvillos ( <i>Puccinia striiformis</i> , <i>P. recóndita</i> , <i>P. graminis</i> ) Oídio ( <i>Blumeria graminis</i> ) Helmintosporiosis ( <i>Drechslera teres</i> ) Rincosporiosis ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )		

**Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque del pulverizador con agua hasta las 3/4 partes. Agitar el envase y adicionar la cantidad requerida de **Ventur**®. Completar con agua a volumen total con agitación constante.

**Incompatibilidades:** No se han determinado incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

**Compatibilidades:** **Ventur**® es compatible con los productos fitosanitarios normalmente usados en cereales como: Perfekthion, Medax Top, Cycocel Extra®. Para favorecer la penetración y cubrimiento, **Ventur**® puede ser mezclado con el surfactante Break. Para mezclas en aplicaciones aéreas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

**Fitotoxicidad:** Evite la deriva de **Ventur**® sobre cultivos susceptibles como parronales, viñas, frutales, maravilla, frejol y algunas hortalizas. Se ha determinado que la deriva de **Ventur**® no produce fitotoxicidad en cebolla, apio, espárrago, lechuga, melón, zanahoria, maíz y raps.

**Períodos de Carencias:** Respete carencia de 35 días en trigo, avena y cebada. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino.

**Tiempo de Reingreso:** 1 hora de espera es suficiente, previa verificación que el depósito aplicado se haya secado completamente. Reingreso para animales no aplica, ya que **Ventur**® no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo.

**Nota:** Con el uso repetido de **Ventur**® o en forma natural en el medio, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de sus mismos modos de acción, pudiendo uno o más patógenos, llegar a ser resistentes a **Ventur**®, obteniéndose un control no satisfactorio bajo condiciones normales de uso. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control de las enfermedades como consecuencia de la pérdida de sensibilidad de los patógenos. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones (máximo 2), emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción, o alternarlo con otros fungicidas de diferente composición química o modo de acción, considerando que según clasificación FRAC, los ingrediente activos de **Ventur**®, epoxiconazol y boscalid pertenecen a los grupos G1 y C2, respectivamente.

® = Marcas registradas BASF



## CUIDADO

