PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: propiconazol pertenece al grupo químico de los triazoles.
No beber, comer o fumar durante la preparación y aplicación del producto.
Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal
Durante la preparación: protector facial, delantal impermeable, botas de goma y guantes impermeables.

Durante la aplicación: máscara con filtro, antiparras, traje de PVC, botas de goma y guantes impermeables.
No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.
Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.
No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Información ecotoxicológica: a la dosis de aplicación recomendada, **Propiconazol 250 EC** no es dañino al medio ambiente, ligeramente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

Síntomas de Intoxicación: puede causar irritación del tracto respiratorio superior (nariz y garganta) y pulmones. Los signos y síntomas de exposición excesiva puede ser: tos, disnea, aumento de las secreciones bronquiales, rinitis y desvanecimiento. El contacto prolongado puede causar leve irritación de la piel. Puede causar moderada irritación. Lagrimeo y conjuntivitis. Si se ingiere moderadamente peligroso. Puede causar náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Anorexia, fiebre, cefalea, depresión del SNC.

Antídoto: no existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Instrucciones para el triple lavado: realizar triple lavado de los envases agregando agua al recipiente hasta un cuarto de su volumen, agitar bien y verter en la máquina pulverizadora, lo cual debe repetirse tres veces.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. De ser necesario consiga ayuda médica inmediatamente. En todos los casos se debe llevar la etiqueta al centro de atención médica.

En caso de contacto cutáneo: retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de ser necesario acudir al médico.

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. Si se requiere, dar respiración artificial y llamar a un médico.

Tratamiento médico de emergencia: no tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

En caso de intoxicación llamar :
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v26042022

PROPICONAZOL 250 EC

Fungicida
Concentrado Emulsionable (EC)

Propiconazol 250 EC, es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa para el control de enfermedades fungosas en frutales, avena, cebada, centeno, maíz y trigo citados en el Cuadro de Instrucciones de Uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos:	**% p/v**	**(g/L)**
Propiconazol*	25,0% p/v	(250 g/L)
Coformulantes c.s.p.	100,0% p/v	(1 L)

* (2*RS*, 4*RS*; 2*RS*, 4*SR*)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1*H*-1,2,4-triazol

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2822

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº:

Cont. Neto: L. Fecha Venc.:

Fabricado por:

agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

Sunrise Crop Science Co., Ltd.,
No. 8, Liwan Road, Salt Chemical New Material Industry Park, Huaian, Juangsu. P.R. China

Distribuidor:

agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:
Propiconazol 250 EC es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa para el control de enfermedades fungosas en frutales, avena, cebada, centeno, maíz y trigo.
Aplicación terrestre y aérea.
Equipo de aplicación:
Pulverizador para aplicación terrestre, avión o helicóptero para aplicación aérea.
Cuadro de instrucciones de uso:
Aplicación terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observación	Carencia (días)
Avena, Cebada Centeno, Maíz, Trigo	Oídio *(Erysiphe graminis)* Royas *(Puccinia graminis, P. hordei, P. striiformis, P. recondita),* Septoriosis *(Septoria tritici)* Rincosporiosis *(Rhynchosporium secalis)*	0,5 L/ha	**Aplicación terrestre:** Realizar la primera aplicación en forma preventiva al aparecer la hoja bandera o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Para el control de Septoria en trigo, aplicar a partir del 2º nudo cuando existan síntomas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Repetir al reaparecer los síntomas o ante condiciones de reinfestación. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L de agua/ha.	Avena, centeno: 50 Trigo: 55 Cebada: 35 Maíz: 30
Damasco Duraznero Nectarino	Oídio *(Sphaerotheca pannosa)*	0,5 L/ha	Aplicar al inicio de caída de pétalos y repetir cada 7 - 10 días hasta endurecimiento de carozo cuando vuelvan a aparecer los síntomas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L de agua/ha.	Damasco: 15 Duraznero: 4 Nectarín: 3
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	Tizón de la flor o Moniliasis *(Monilia laxa)*	0,5 L/ha	Aplicar a inicios de flor y repetir en plena flor si hay condiciones predisponentes a la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L de agua/ha.	Ciruelo, Cerezo, Nectarín: 3 Almendro: 53 Damasco: 15 Duraznero: 4
	Roya *(Tranzschelia discolor)*		Aplicar antes de que aparezcan los síntomas, desde mediados de noviembre. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 3 - 4 semanas. Mojamiento sugerido: 1.500 L de agua/ha.	
Duraznero Nectarino	Pudrición ácida *(Geotrichum candidum)*	50 cc/100 L de agua. Aplicar un mínimo de 500 cc/ha	Aplicar 5 a 7 días previos a la cosecha. Para el caso de cosechas de más de 15 días, repetir la aplicación a los 7 - 10 días. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L de agua/ha.	Duraznero: 4 Nectarino: 3
Apio	Septoriosis *(Septoria apii)*	0,5 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Intervalo entre aplicaciones: 14 - 18 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.	50

Aplicación aérea:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observación	Carencia (días)
Avena Cebada Centeno Maíz Trigo	Oídio *(Erysiphe graminis)* Royas *(Puccinia graminis, P. hordei, P. striiformis, P. recondita)* Septoriosis *(Septoria tritici)* Rincosporiosis *(Rhynchosporium secalis)*	0,5 L/ha	Realizar la primera aplicación en forma preventiva al aparecer la hoja bandera o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Para el control de Septoria en trigo, aplicar a partir del 2º nudo cuando existan síntomas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Repetir al reaparecer los síntomas o ante condiciones de reinfestación. Mojamiento sugerido: 40 L de agua/ha.	Avena, centeno: 50 Trigo: 55 Cebada: 35 Maíz: 30

Preparación de la mezcla: para cada una de las aplicaciones, agregar **Propiconazol 250 EC** al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, luego completar el estanque y aplicar.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico si se utiliza en los cultivos y dosis recomendados en esta etiqueta.

Incompatibilidad: compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. Incompatible con productos de reacción alcalina. En caso de dudas realizar prueba de compatibilidad.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación, para animales no corresponde por tratarse de cultivos que no están destinados a la alimentación animal.

Precauciones: para evitar el aparecimiento de razas resistentes, contemplar antes y después del uso de **Propiconazol 250 EC** la aplicación de otros fungicidas químicos o mezclas que incluyan otros grupos químicos y/o distintos modos de acción a los IBE/triazoles.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

USO EXCLUSIVO AG

NOCIVO