

# SUNNY® 5 SC

## Fitorregulador - Suspensión Concentrada (SC)

Fitorregulador de crecimiento de las plantas utilizado para disminuir el crecimiento vegetativo y mejorar la forma calidad del fruto, además de aumentar el rendimiento por un aumento en la cuaja de los frutos de Paltos.

**Composición:**  
Uniconazol-p.....5% p/v (50 g/l)  
Coformulantes, c.s.p.....100% p/v (1 l)  
**Lote:**  
**Fecha de Fabricación:**  
**Fecha de Vencimiento:**

\*[E)-(RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H,1,2,4-triazol-1-il)-pent-1-en-3-ol]

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4188

Contenido neto: Litros

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO  
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Fabricado por: **Adama Agan Ltd**  
Northern Industrial Zone  
P.O.B. 262 Ashdod 77102  
Israel



Distribuido por: **ANASAC CHILE S.A**  
Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO - CHILE

Importado por:  
♦ SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.  
Av. Kennedy 5735 Of. 1601  
Torre Fontaine, Las Condes  
Santiago, Chile.  
Fono: (56)228350500

® Marca Registrada

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• Uniconazol-p pertenece al grupo químico de los triazoles. • Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Conservar en su envase de origen y bajo llave. • Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación, use cuantes impermeables, botas de goma, protector facial, overol impermeable. Durante la aplicación, use cuantes impermeables, botas de goma, protector facial, overol impermeable. • No comer, no fumar ni beber durante el uso del producto. • No aplicar con viento y no trabajar en la neblina de la aplicación. Aleje animales y personas extrañas. • Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

**Síntomas de intoxicación:** Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sudor, salvación, opresión en el pecho, visión borrosa y malestar general. El producto puede resultar irritante a los ojos.

### Primeros Auxilios.

En caso de "contacto con los ojos", lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Obtenga asistencia médica si hay irritación.

En caso de "inhalación": Trasláde al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial y buscar asistencia médica inmediatamente. En caso de "ingestión": **NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Buscar asistencia médica inmediatamente para tratamiento adecuado.

En caso de "contacto con la piel": Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Obtenga asistencia médica si hay irritación.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén.  
**Riesgos Ambientales:** Tóxico a peces y fauna marina. No tóxico aves y abejas. No contamine cursos de agua.  
"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO AUTORIZADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBE EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE". "REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "PARA APLICACIONES AEREAES OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE".

**Instrucciones para Triple Lavado:** Una vez vació el envase, agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. Luego perforo el envase para evitar su reutilización.

**Telefonos de Emergencia:** SUMITOMO CHEMICAL CHILE S.A.: (56)228350500 / CITUC (Convenio CITUC/ARPPA): (56)228353800 (Atención las 24 horas)  
CITUC Químico (Emergencia química): (56)222473600



## CUIDADO

