

# TRIPLEX 600 SC

## ACARICIDA SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.558

**TRIPLEX 600 SC**, acaricida que actúa por contacto e ingestión con largo efecto residual, específico para el control de las formas móviles de ácaros descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

### COMPOSICIÓN:

Cihexatina (Cihexaestán) (*) .....	60% p/v (600 g/l)
Coformulantes c.s.p .....	100% p/v (1 l)
(*) Hidróxido de triclorohexilestano.	

**<<LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>**

Fabricado por:  
**ANASAC CHILE S.A**  
Camino Noviciado Norte Lote 73-B  
LAMPA – CHILE

Lote N°  
Contenido Neto:  
Fecha Vencimiento:

Distribuido por:  
  
**ANASAC CHILE S.A**  
Almirante Pastene 300 - Providencia  
SANTIAGO – CHILE

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**TRIPLEX 600 SC**, acaricida cuyo ingrediente activo Cihexatina pertenece al grupo químico de los organoestánicos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**TRIPLEX 600 SC**, es moderadamente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para microcrustáceos acuáticos. Ligeramente tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

**<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS >>**

**<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>**

**<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>**

**<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>**

**<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>**

**Instrucciones de Triple lavado:** Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios:** **En caso de contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. **En todos los casos** trasladar al paciente en forma inmediata a un centro asistencial llevando en lo posible la etiqueta o envase del producto. **Síntomas de intoxicación:** Irritación de piel, ojos y de las vías respiratorias superiores. En caso de ingestión se presentan náuseas, vómitos, diarrea. Además, cefalea, vértigo, debilidad general, convulsiones.

**<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>**

**Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)**

**<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>**

Conserve **TRIPLEX 600 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

**Nota al comprador:** A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



**NOCIVO**



## INSTRUCCIONES DE USO

**TRIPLEX 600 SC**, acaricida específico para el control de las formas móviles de ácaros descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

### Cuadro de Instrucciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cc/hL	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Almendro, Nogal, Manzano, Peral, Duraznero, Ciruelo	Araña roja, Araña parda, Araña bimaclada, Acaro del plateado	30-50	Aplicar en el período postfloral controlando ninfas y adultos de arañas. Luego aplicar en focos de araña cuando el promedio por hoja alcance 2 a 3 ácaros.	Manzano, Peral: 30 Ciruelo: 28 Durazno: 60 Almendro, Nogal: 35
Vid	Falsa araña de la vid, Araña bimaclada, Erinosis de la vid	40-60	Aplicar al comienzo de primavera y a fines de verano. La primera aplicación debe realizarse cuando se observan los primeros adultos en los brotes.	Vid: 30
Frambuesa, Frutilla	Araña roja, Araña bimaclada	30-50	Aplicar al observar los primeros estados móviles.	40

### Instrucciones de uso:

- Aplicar solo 1 vez por temporada
- Utilizar mojamientos de 2000 - 3000 L agua/ ha, según tamaño y desarrollo de los árboles.
- Usar dosis menor con niveles bajos de infestación y dosis mayor en control de falsa araña o con niveles altos de infestación.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 km/hr.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer, evitando el secado muy rápido de la pulverización.
- No aplicar durante las horas de más calor (sobre 30 °C).
- No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

**Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque de aplicación hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **TRIPLEX 600 SC**, completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

**Compatibilidad:** **TRIPLEX 600 SC**, es compatible con insecticidas de uso común: DIMETOATO 40 EC y CARBARYL 85 WP.

**Incompatibilidad:** **TRIPLEX 600 SC** es incompatible con productos alcalinos, Ej. Caldo Bordelés. En caso de dudas realizar pruebas de compatibilidad. No mezclar con aceites emulsionables. Dejar pasar 15 días entre una aplicación de aceite y la de **TRIPLEX 600 SC**. No aplicar en mezcla con humectantes.

Aplicar **TRIPLEX 600 SC**, al menos 10 días después de aplicado Cloruro de calcio y no aplicar Cloruro de calcio antes de 7 días de aplicado **TRIPLEX 600 SC**.

**Fitotoxicidad:** No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las recomendaciones de la etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



**NOCIVO**

