

INSTRUCCIONES DE USO

NIMROD® 25 EC es un fungicida sistémico translaminar, eficaz en el control preventivo del oídio en vides. Posee un modo de acción único, el ingrediente activo bupirimato se absorbe en el hongo e inhibe la enzima adenosina deaminasa (ada-asa) involucrada en la síntesis de ácidos nucleicos dentro de las células fungosas. Debido a su acción sistémica se desplaza en el xilema de la hoja protegiendo contra la enfermedad, aun en condiciones intensas de lluvia. Su acción translaminar le permite actuar a través de la hoja para controlar la infección, aun en la superficie que no fue asperjada. Grupo FRAC 8, MDA A2: metabolismo de ácidos nucleicos adenosina deaminasa.

CUADRO INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN TERRESTRE

CULTIVO	PLAGAS	CONCENTRACION cc/hL	OBSERVACIONES
Vides (uva de mesa)	Oídio (<i>Erysiphe necator</i>)	80 cc/hL	Aplicar preventivamente y/o antes de que aparezcan los primeros signos de la enfermedad, desde inicio de brotación en adelante, realizando la primera aplicación con brotes de aproximadamente 20 cm (pre- flor BBCH 5.3-5.4) y una segunda aplicación con brotes de 60 a 80 cm de largo (flor BBCH 5.7-6.0), según condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. No aplicar después de flor. Número Máximo de aplicaciones: realizar hasta 2 aplicaciones por temporada, a intervalos de 14 días, intercalando cada 7 días con productos de otros grupos químicos. Mojamiento sugerido 1000 L de agua/ha. En aplicaciones de bajo o alto volumen, respetar concentración de 80 cc/hL

Preparación de la Mezcla: Verter en el tanque de preparación la dosis a ocupar de **NIMROD® 25 EC** en la mitad del volumen de agua total a emplear manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea, y finalmente rellenar con el agua faltante. **Precaución de aplicación:** Para una mejor acción se recomienda realizar las aplicaciones en horarios de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar durante las horas de más calor (> 25°C). Para evitar la deriva durante la aplicación, se recomienda no realizar aplicaciones con viento mayor a 8 km/hr. **Fitotoxicidad:** Según las recomendaciones de uso de esta etiqueta **NIMROD® 25 EC** no es fitotóxico. **Compatibilidad:** **NIMROD® 25 EC** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. **Incompatibilidad:** **NIMROD® 25 EC** es incompatible con productos de reacción alcalina o ácida. En caso de utilizarse en mezcla se recomienda realizar una prueba a una pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. **Periodos de Carencia:** Vides 70 días. **Tiempo de Reingreso al Área Tratada:** Período de resguardo para el ingreso de las personas es de 12 horas. No corresponde indicar período de reingreso para animales por tratarse de cultivos que no son destinados al consumo animal. **Manejo de resistencia:** para el manejo de resistencia dentro del programa fitosanitario, se sugiere realizar hasta dos aplicaciones alternadas de **Nimrod® 25 EC** con otros plaguicidas de distintos grupos químicos.

