

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- **Ferbam** pertenece al grupo químico de los dimetilditiocarbamatos.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

**Síntomas de intoxicación:** Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dermatitis. Puede irritar la piel y las membranas mucosas.

### Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Si el afectado utiliza lentes de contacto retirarlos previamente lavándolos con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego continuar con el lavado normal hasta completar 15 a 20 minutos. Consultar al médico si es necesario.
- **Contacto con la piel:** sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua de la llave, retirar ropa y zapatos y lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si ocurre irritación consultar al médico.
- **Inhalación:** reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.
- **Ingestión:** ingerir grandes cantidades de agua e inducir el vómito. Llamar al médico inmediatamente para tratamiento inmediato.

**Tratamiento médico de emergencia:** En caso de ingestión, realizar lavado gástrico e ingerir 30 gr de carbón vegetal activado en un poco de agua, y luego sulfato de sodio catártico. No beber alcohol durante tres semanas. Posteriormente realizar tratamiento sintomático y de sostén.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Riesgos ambientales: Ferbam 76 WG** en condiciones normales de uso no es tóxico a abejas y aves. Es tóxico para peces. No contamine cursos de agua.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”. “NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”.

### Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000  
CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800 (**Atención las 24 horas**)  
CITUC Químico (Emergencia química): (56) 22247 3600

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además

# ■ BASF

We create chemistry

# Ferbam 76 WG

## Fungicida Granulado dispersable (WG)

**Ferbam 76 WG** fungicida de contacto con acción preventiva indicado para el control de las enfermedades en los cultivos indicados en Instrucciones de Uso.

### Composición:

Ferbam\* .....76% p/p (760 g/Kg)  
Coformulantes, c.s.p.....100% p/p (1 Kg)  
\*Dimetilditiocarbamato férrico

### Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N°: 2292

### NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

### Lote:

### Vencimiento:

### Contenido neto: 20 Kilos

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:  
**Taminco BVBA**  
Panterschipstraat 207  
B-9000 Ghent  
Bélgica

Importado y  
Distribuido por:  
**BASF Chile S.A.**  
Carrascal 3851  
Fono: (56) 22 6407000  
Casilla 3238  
Santiago - Chile

## INSTRUCCIONES DE USO

### GENERALIDADES

**Ferbam 76 WG** es un fungicida de contacto, que actúa en forma preventiva, con amplio espectro de acción, que tiene gran actividad para el control de la cloca y tiro de munición (corineo), y para las otras enfermedades indicadas en Instrucciones de Uso.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Enfermedad	Dosis (g/100 L agua)	Observaciones
Durazneros, nectarines	Cloca ( <i>Taphrina deformans</i> ) Tiro de munición ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ) Moniliasis ( <i>Monilinia laxa</i> )	200 - 240	Aplicar desde yema hinchada hasta comienzos de botón rosado (para prevenir la enfermedad), y en otoño a caída de hojas (para bajar inóculo de la enfermedad que se presentarán los síntomas desde yema hinchada en adelante). Si las condiciones para la enfermedad continúan después de la primera aplicación repetir a los 7 a 10 días después. <b>Ferbam</b> tiene efecto secundario sobre moniliasis. Realizar máximo dos aplicaciones por temporada.
Ciruelos, damascos	Tiro de munición ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	180 - 240	Aplicar entre inicio de yema hinchada hasta inicio de botón rosado, según se presenten las condiciones y en otoño a caída de hojas. Realizar máximo dos aplicaciones por temporada.
Almendros	Roya ( <i>Tranzschelia</i> spp) Moniliasis ( <i>Monilinia laxa</i> )	180 - 240	Aplicar en caída de hoja y en yema hinchada. Realizar máximo dos aplicaciones por temporada.
Espárragos	Mancha púrpura ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	200 - 240	Aplicar sólo en postcosecha y con follaje presente, al observar los primeros síntomas. Repetir inmediatamente después de una lluvia, ó cada 10 a 14 días según las condiciones de infección. Realizar máximo dos aplicaciones por temporada.

### Mojamiento

En durazneros, nectarines, ciruelos, damascos y almendros, aplicar con 1.200 - 1.800 L agua/ha, en árboles en plan producción. Para plantaciones de menor desarrollo, que requieren menor volumen de agua, mantener la dosis en g/100 L, ajustando el volumen de agua a lo necesario para un buen cubrimiento. En espárragos aplicar con 300 - 800 L agua/ha dependiendo del tamaño del follaje.

### Preparación de la mezcla

Prediluir **Ferbam 76 WG** en un poco de agua y luego adicionar al estanque a medio llenar de agua, manteniendo en movimiento el sistema de agitación hasta completar a volumen total con agua.

### Incompatibilidades

No mezclar con productos alcalinos y aceite. Evitar su uso inmediatamente después de un aplicación de compuestos cúpricos.

### Compatibilidades

**Ferbam 76 WG** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso corriente, con fertilizantes foliares y Break.

### Fitotoxicidad

**Ferbam 76 WG** no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta y puede favorecer el cultivo por su aporte de hierro.

### Períodos de Carencias

No corresponde carencia por el momento de aplicación.

### Tiempo de reingreso

Se recomienda una espera de 2 horas, verificando previamente que el depósito aplicado se haya secado completamente. Tiempo de reingreso para animales, no aplica, ya que el producto no está recomendado para cultivos destinados a pastoreo directo.



# CUIDADADO

