

HERBICIDA
FUROR 75 WP
POLVO MOJABLE (WP)

Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3478.

FUROR 75 WP, corresponde a un herbicida de acción sistémica para el control de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de USO

COMPOSICION:

| | |
|--|--------------------|
| * Nicosulfurón | 75% p/p (750 g/kg) |
| Cofomulantes c.s.p | 100% p/p (1 kg) |
| *1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil)urea | |

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>



Distribuido por:
ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO – CHILE

Lote N°:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA – CHILE

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

FUROR 75 WP, es un herbicida en base a nicosulfuron perteneciente al grupo químico de las sulfonilureas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del concentrado sólido usar delantal impermeable, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

FUROR 75 WP, es prácticamente no tóxico para aves, peces y microcrustáceos acuáticos. Ligeramente tóxico para abejas.

<< **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS** >> << **LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES** >> << **LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE** >> << **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA** >> << **NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO** >>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** quitar la ropa contaminada y lavar la zona expuesta con abundante agua de la llave. **En caso de contacto ocular:** lavar muy bien y en forma cuidadosa los ojos, irrigando copiosamente con agua limpia, durante 15 minutos, levantando de vez en cuando los párpados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. **En caso de inhalación:** en caso de dificultad respiratoria, practicar respiración artificial boca a boca, llevar al trabajador afectado al aire fresco. **En caso de ingestión:** si el afectado está consciente, administrar una taza de agua. **NO INDUCIR VOMITOS.** Mantener al afectado en lugar fresco y oscuro. **En todos los casos** trasladar al afectado al hospital, llevando el envase o la etiqueta del producto.

Síntomas de intoxicación: irritación ocular, dermal y de las vías respiratorias. En caso de ingestión reciente se presenta diarrea, vómitos, dolores.

<< **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD** >>


Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL** >>

Conserve **FUROR 75 WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave exclusivo para fitosanitarios. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

02015026



CUIDADO



FUROR 75 WP, corresponde a un herbicida de acción sistémica para el control de las malezas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso, siendo selectivo en el tratamiento post-emergente en cultivo de maíz.

Instrucciones de uso:

| CULTIVO | MALEZAS | DOSIS g/Ha | OBSERVACIONES |
|---------|--|------------|---|
| MAIZ | Maicillo, hualcacho, ballica, setaria, pasto quila, chamico, bleado, suspiro | 70 | Aplicar de Post-emergencia del maíz, al estado de 4-8 hojas. El maicillo proveniente de semilla o rizoma debe tener 15-40 cm de altura. En otras malezas gramíneas aplicar hasta el estado de 4 hojas. Malezas dicotiledóneas hasta el estado de 6 hojas verdaderas. El volumen de aplicación con equipo convencional 200-250 L agua /ha. |

Instrucciones de Uso:

Se recomienda una sola aplicación por temporada de cultivo.

Debe aplicarse dirigido al suelo, con humedad y antes de la emergencia de las malezas. Se recomienda en períodos de lluvia para ayudar a su incorporación; esto es en invierno.

Se aplica mediante pulverización diluyendo el producto en agua según la dosis recomendada y con equipo convencional de barra y boquilla de abanico plano para herbicidas. Volumen de agua: 200 L/ha.

Se aplica una sola vez por temporada en la post emergencia del cultivo, cuando el maíz tiene 4-8 hojas, la maleza gramínea entre 2-4 hojas y las malezas de hoja ancha hasta 6 hojas verdaderas.

Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora.

Evitar aplicar con temperaturas superiores a 28°C.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad recomendada de FUROR 75 WP previamente diluido en un balde. Luego, completar hasta el nivel deseado con agua, manteniendo agitación constante

Compatibilidad: Furor 75 WP Es compatible con surfactantes no iónicos.

En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: Productos fosforados al follaje del cultivo deben separarse una semana de la aplicación de FUROR 75 WP. Consultar con empresas productoras de semillas de maíz por la susceptibilidad varietal al herbicida Nicosulfuron. No aplicar en cultivo distintos al maíz.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos en los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta. Existen algunos materiales parentales de origen francés y algunas variedades de maíz blanco sensibles a nicosulfuron, en estos casos se recomienda consultar a la empresa proveedora de semillas.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

Carencias: No corresponde, la aplicación va dirigida al suelo para el control de las malezas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.



CUIDADO

