

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: Acetato de (Z)-8-dodecen-1-ilo y Acetato de (E)-8-dodecen-1-ilo pertenecen al grupo químicos de los acetatos alifáticos insaturado. El (Z)-8-dodecen-1-ol pertenece al grupo químico de los alcoholes alifáticos insaturados.

PHEROCON® OFM no es un producto tóxico para los seres humanos, animales de sangre caliente y no produce daños a los insectos beneficiosos. No existen medidas de protección para su instalación por utilizarse en forma de trampas. En la manipulación del producto es necesario usar guantes impermeables. **PHEROCON® OFM** por tratarse de una cápsula impregnada con la feromona, no debe ingerirse. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y bajo llave. Guarde el producto en un lugar refrigerado cuando se prolongue el tiempo de almacenaje (mayor a 6 meses), o en un lugar fresco y seco cuando el almacenaje es por un período breve. Elimine los envases vacíos inutilizándolos, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad pertinente.

Síntomas de intoxicación: Es una cápsula de goma impregnada de feromona. Los síntomas de intoxicación pueden ser por Contacto con la piel: En caso de contacto directo puede ocasionar irritación en la piel. Por Inhalación: No es irritante. Contacto con los ojos: En caso de contacto directo puede ocasionar irritación en los ojos. Ingestión: Puede ser tóxico si se ingiere.

Primeros auxilios: En caso de **inhalación**, trasladar al paciente al aire libre, llamar a un médico. En caso de **contacto con los ojos**, lavar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que e afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el anjuaque. Si persiste la irritación, vea a un médico. En caso de **contacto con la piel**, lave muy bien el área de contacto con agua limpia. Si es necesario llame a un médico. En caso de **ingestión**, es muy improbable por el tipo de formulación que ocurra ingestión, sin embargo, si llegara a ocurrir, dar a beber 1 vaso de agua al afectado y NO inducir vomito. Llevar al afectado a un centro asistencial.

Antídoto: No existe antídoto específico.

ECOTOXICIDAD: No produce daño a insectos beneficiosos, aves, peces ni abejas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.** EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA - CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 2560 4500, Santiago, Chile.



Lote N°:

Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 4017

PHEROCON® OFM, trampas de feromona sexual para detectar polilla oriental (*Cydia molesta*), consiste en 3 estaciones con sus recambios de Feromonas y trampas para monitorear la plaga durante toda la temporada.

COMPOSICIÓN

Acetato de (Z)-8-dodecen-1-ilo.....	93,1 % p/p (0,1862 mg/cápsula)
Acetato de (E)-8-dodecen-1-ilo.....	5,9 % p/p (0,0118 mg/cápsula)
(Z)-8-dodecen-1-ol.....	1,0 % p/p (0,002 mg/cápsula)
Coformulantes, c.s.p.....	100 % p/p (0,2 mg/cápsula)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Contenido Neto: 1 kit con 3 estaciones,
12 cápsulas y 12 Trampas

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET4017V-009-12T
OS3

Fabricado por:
TRECE INCORPORATED
P.O. Box 129
7569 Highway 28 West
Adair, Oklahoma
Estados Unidos 74330

INSTRUCCIONES DE USO:

PHEROCON® OFM se recomienda para detectar y conocer las poblaciones de Polilla Oriental en Durazneros, Nectarines, Ciruelos, Cerezos, Almendros, Manzanos y Perales cuando hay un ataque. Permite tener una herramienta y/o referencia para programar, y evaluar su control y las aspersiones que correspondan.

PHEROCON® OFM NO SE RECOMIENDA PARA CONTROL DE POLILLA ORIENTAL.

Las Trampas **PHEROCON® OFM** se instalarán previo al inicio del primer vuelo.

PHEROCON® OFM entrega resultados sobre el vuelo del macho, el que se deberá interpretar de acuerdo al folleto adjunto y/o las instrucciones del especialista o asesor.

PHEROCON® OFM se deben armar siguiendo cuidadosamente las instrucciones del manual de armado que viene en la caja. Se deben colgar en los árboles, a la altura de 0,8 - 1,0 mt. desde la parte superior máxima del árbol hacia abajo.

Las Trampas deben quedar instaladas en hileras interiores del huerto, protegidas del polvo, viento, equipos y maquinarias.

Las Trampas se deben revisar en la mañana cada 2 a 3 días y anotar las capturas. Una vez chequeada limpiar la trampa de los individuos capturados y esparcir nuevamente el pegamento. Sugerimos leer las indicaciones del Manual de Trampas de Arysta LifeScience Chile S.A. Las Trampas se deben cambiar cada dos meses o cuando estén muy sucios, lo que ocurra primero. Es necesario sacar las Trampas al rastrear el huerto para evitar el polvo. Las cápsulas se reemplazarán cada 10 semanas teniendo precaución de abrir el envase de la cápsula la noche anterior a la instalación o recambio. Las cajas con las cápsulas se deben almacenar en un lugar fresco donde la temperatura no supere los 15°C dentro de un periodo de 6 meses. Si se guardan de un año para otro, se deben almacenar refrigeradas en el sector de las verduras, no junto a ellas, sino a la temperatura a la cual se encuentra el refrigerador en esa zona (4 a 5°C).

Densidad de Trampas **PHEROCON® OFM** :

Huertos/Hectáreas	Número de Trampas/Hectáreas
Huertos de 1 - 8 ha :	1 Trampa cada 2 a 2,5 ha
Huertos de 8 - 16 ha :	1 Trampa cada 3 a 4 ha
Huertos de 16 - 32 ha :	1 Trampa cada 5 a 6 ha

Para esta densidad de Trampas los huertos deben ser uniformes en tamaño, especie y variedad frutal. Si no fuese así, cada huerto deberá tratarse como un caso individual.

Los huertos nuevos deben monitorearse separadamente, ya que por su copa menos densa permiten un anticipo de la emergencia de los insectos. En estos casos se recomienda efectuar las instalaciones de Trampas una semana antes, por lo menos, que lo indicado para huertos adultos.

INCOMPATIBILIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto.

FITOTOXICIDAD: No corresponde por la naturaleza del producto.

PERIODO DE CARENIA: Esta libre de Carencias por ser un producto natural emitido por los insectos y no se aplica sobre los cultivos si no que se instala como trampa.

TIEMPO DE REINGRESO: No tiene restricción en el tiempo de reingreso por la naturaleza del producto.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

®**PHEROCON OFM** es Marca Registrada de TRÉCÉ Inc.



CUIDADO

