

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Miclobutanilo pertenece al grupo químico de los Triazoles.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal: Durante la preparación usar de protección protector facial, delantal impermeable, botas de goma y guantes impermeables.

Equipo de protección personal durante la aplicación, usar de protección, overol impermeable, botas de goma, guantes impermeables, antiparras y máscara con filtro. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.

Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Información Ecotoxicológica: Miclobutanil 40 WP Agrospec, es moderadamente tóxico a organismos acuáticos y peces, ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas.

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas, cefalea, dolor abdominal.

Antídoto: Sin antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco o alejado del lugar de exposición. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico.

En caso de Contacto con la piel: Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si los síntomas persisten acudir a un médico especialista.

En caso de Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. De ser necesario consiga ayuda médica inmediatamente. En todos los casos se debe llevar la etiqueta al centro de atención médica.

En caso de Ingestión: No inducir vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Consiga ayuda médica inmediatamente.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE PERSONAS INEXPERTAS**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO
O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**LA ELIMINACION DE LOS RESIDUOS DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO
A LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS
VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS,
RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO
INDICADO DE REINGRESO**

**En caso de intoxicación llamar :
Centro Atención Toxicológica UC teléfono: 56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000**

MICLOBUTANIL 40 WP AGROSPEC

**Fungicida
Polvo Mojable (WP)**

MICLOBUTANIL 40 WP AGROSPEC, es un fungicida sistémico, preventivo, recomendado para el control de enfermedades foliares y de los frutos de los cultivos citados en el Cuadro de Instrucciones de Uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	% p/p
Miclobutanilo*	40% p/p (400 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.:	100% p/p (1 kg)

*(RS)-2-p-clorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanonitrilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2661

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Formulado y Distribuido por:

Agrospec

Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

MICLOBUTANIL 40 WP AGROSPEC, es un fungicida de la familia de los triazoles, sistémico, con acción preventiva y de contacto.

Equipo de aplicación: Pulverizador.

Preparación de la mezcla: Para cada una de las aplicaciones, realizar la dilución en agua, agregando Miclobutanil 40 WP Agrospec al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, para luego completar con agua el estanque y aplicar.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIAS (días)
Vides	Oidio <i>Uncinula necator</i>	7,5 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 - 10 cm de largo, repetir cada 10 - 12 días. Usar 1.500 - 2.000 L/ha de agua. N° aplicaciones por temporada: 2.	10
Manzano Peral	Venturia <i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i>	7,5 - 10 g/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones en puntas verdes, repitiendo cada 7 a 10 días o según condiciones. Usar 1.500 - 2.000 L/ha de agua. Presenta 96 h de efecto retroactivo. N° aplicaciones por temporada: 3.	Manzano: 14 Peral: 18
Manzano	Oidio <i>Podosphaera leucotricha</i>	10 - 12,5 g/100 L de agua	Iniciar en caída de pétalos, y repetir mientras sea necesario cada 10 - 14 días. Mojamiento: 2.000 L/ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	14
Duraznero Nectarino	Oidio <i>Sphaerotheca pannosa</i> Tizón de la flor <i>Monilia laxa</i>	8 - 10 g/100 L de agua 250 - 300 g/ha	Aplicar con fruto tamaño arveja o al presentarse los primeros síntomas. Repetir cada 15 días hasta endurecimiento del carozo. Primera aplicación con botón rosado y repetir si fuera necesario en caso de lluvia. Mojamiento: 2.000 L/ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	3
Tomate Pimiento	Oidio <i>Erysiphe polygoni</i>	75 - 120 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos, a medida que crece el cultivo aumentar las dosis de aplicación. Mojamiento: 200 - 300 L/ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	Tomate: 10 Pimiento: 7
Remolacha	Oidio <i>Erysiphe polygoni</i>	125 - 150 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. N° aplicaciones por temporada: 2.	15
Melón Sandía Zapallo	Oidio <i>Erysiphe cichoracearum</i>	80 - 100 g/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento: 500 L/ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	7

Utilizar siempre las dosis menores recomendadas, y en condiciones de alta presión de enfermedad, utilizar dosis mayores.

Precaución: Para evitar problemas de resistencia, intercalar con productos de distinto modo de acción. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), y no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.

Incompatibilidad: Incompatible con los pesticidas de reacción alcalina o con Caldo Bordolés y Polisulfuro de Calcio. Si se utiliza en mezcla con otros pesticidas se recomienda realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de cada aplicación.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación para personas. Para animales no corresponde por ser un cultivo no destinado a la alimentación animal.

Nota del fabricante: El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

