

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

El ingrediente activo de **SIMANEX® 90 WG** es la Simazina que pertenece al grupo químico de las 1, 3, 5 - triazinas. Se debe evitar su inhalación, contacto con la piel y proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos.

**Durante la preparación** del producto se requiere ventilación y usar: mascarilla para polvo, delantal impermeable, botas de goma, guantes impermeables y antiparras. **Durante la aplicación** usar protector facial, traje impermeable de PVC, botas de goma y guantes impermeables. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina líquida del producto asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

**Información Ecotoxicológica:** es prácticamente no tóxico para peces, microcrustáceos acuáticos y aves. Ligeramente tóxico para abejas.

**RETIRAR COLMENAS PREVIO LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL, NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. PRIMEROS AUXILIOS:**

**En contacto cutáneo,** retirar ropas y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y jabón la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Procure asistencia médica. **En caso de contacto ocular** lavar los ojos con abundante agua de la llave, durante al menos 15 minutos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consulte al médico en caso de irritación. **En caso de inhalación,** trasladar al afectado al aire fresco, tenderlo y abrigarlo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Procurar asistencia médica. **En caso de ingestión,** enjuagar la boca. NO PROVOCAR VÓMITO. Trasladar en forma inmediata a un centro asistencial. No administrar nada oralmente a una persona inconsciente.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Dolor abdominal, somnolencia, espasmos musculares, posible irritación cutánea.

**ANTÍDOTO:** No existe antídoto específico.

**TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Realizar tratamiento sintomático  
**Teléfonos de emergencia:** En caso de INTOXICACIÓN, llamar al fono: 22635 3800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 horas, convenio CITUC/AFIPA. El teléfono del importador es: 228550048.

**Almacenamiento:** Almacenar solamente en su envase original. Manténgase en lugar fresco, seco, bien ventilado y lejos de la luz solar directa. No almacenar cerca de alimentos o piensos.

**Nota al Comprador:** El fabricante garantiza la óptima calidad y el porcentaje de ingrediente activo señalado en la etiqueta, hasta que el producto salga de nuestro control directo, ya que el manejo de éste es de responsabilidad absoluta del usuario. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. El fabricante y el distribuidor declinan toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento, uso y manejo de este producto cualquiera sea el método de aplicación que se emplee.

# SIMANEX® 90 WG

## HERBICIDA GRANULADO DISPERSABLE (WG)

**SIMANEX® 90 WG**, es un herbicida sistémico, selectivo con acción residual, que controla malezas principalmente de pre-emergencia, en variados cultivos, tal como se detalla en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### COMPOSICIÓN:

\*Simazina..... 90% p/p (900 g/kg)  
Cofomulantes c.s.p..... 100% p/p (1 kg)  
\*6-cloro-N<sup>2</sup>,N<sup>4</sup>-dietil-1,3,5-triazina-2,4-diamina

Lote N°:

Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3451

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: .....Kg**

Fabricado por:  
**ADAMA AGAN LTD.**  
P.O.Box 262, Northern Industrial Zone,  
Ashdod 77102  
Israel

Importado y Distribuido por:  
**Adama Chile S.A.**  
Camino Catemito 2800, Lote A2  
Santa Gabriela, Calera de Tango  
Santiago - Chile

**SIMANEX® 90 WG** es marca registrada de AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.

## INSTRUCCIONES DE USO

**SIMANEX® 90 WG**, es un herbicida sistémico, selectivo con acción residual, que controla malezas principalmente de pre-emergencia en variados cultivos, tal como se detalla en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (Kg/há)	OBSERVACIONES
Manzano, Peral, Naranja, Limonero, Pomelos, Tangelos, Clementino, Palto, Olivo, Nogal, Viñas y Parronales	<b>Anuales de hoja ancha:</b> Amor Seco Bledo Bolsita del pastor Cardo Chamico Hierba del Chancho Chépica del Sur Hierba Azul Hierba Cana Yuyo	2.5 - 4.0	Realizar 2 aplicaciones en la banda de plantación por temporada con intervalos de 90-120 días. No aplicar en Viñas y Parronales con menos de 3 años de establecimiento. No aplicar en huertos de Manzano, Peral, Nogal, Naranja, Limoneros, Pomelo, Tangelo, Clementino, con menos de 1 año de establecimiento. Usar las dosis más altas en suelos arcillosos o pesados. Utilizar un mojamiento de 200 - 250 L de agua/há.
Lupino	Duraznillo Gatillo Ortiga	1.25 - 2.0	Realizar 1 aplicación en pre emergencia del cultivo y de las malezas. Utilizar un mojamiento de 200 - 250 L de agua/há.
Espárragos	Manzanillón Pimpinela escarlata Quingüilla Sanguinaria Senecio Verdolaga Vinagrillo Retamillo Rábano	2.5 - 4.0	Realizar 1 aplicación antes de la emergencia de los turiones. En el caso de espárrago blanco, realizar 1 aplicación lo antes posible después del aporcado. No usar en suelos arenosos o con bajo porcentaje de materia orgánica (< 1,5%). Utilizar un mojamiento de 200 - 250 L de agua/há.
Plantaciones forestales: Pino y Eucalipto	Achicoria Berro Mostaza  <b>Gramíneas anuales:</b> Hualcacho Piojillo Piojillo Avenilla	2.5 - 4.0	Realizar 1 aplicación de pre o post plantación, con suelo húmedo, previo a la emergencia de las malezas. Usar dosis mayores en suelos de alto contenido de materia orgánica. En post emergencia realizar una segunda aplicación, 40 días después de establecidas las plantas y en emergencia de las malezas. Utilizar un mojamiento de 200 - 250 L de agua/há.

**Nota:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación está fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustraer de nuestro control directo.

**Recomendaciones:** Se recomienda su aplicación en dosis bajas para suelos livianos y/o de bajo contenido de materia orgánica, y dosis altas en suelos pesados con un adecuado porcentaje de materia orgánica.

**Preparación de la Mezcla:** Agregar la cantidad de **SIMANEX® 90 WG** al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

**Fitotoxicidad:** **SIMANEX® 90 WG** al ser usado de acuerdo a las recomendaciones y los cultivos indicados, no presenta problemas de fitotoxicidad.

**Precauciones de aplicación para las abejas:** se recomienda realizar las aplicaciones de **SIMANEX® 90 WG** temprano en la mañana o al final del día, de manera de evitar presencia de abejas en el huerto durante la aplicación. Procurar el retiro de colmenas previo a la aplicación de producto.

**Compatibilidad:** **SIMANEX® 90 WG** es compatible con herbicidas de uso común, como por ejemplo: Paraquat, Diquat, Glifosato y Reguladores de pH. También puede ser aplicado con insecticidas como Clorpirifos, Carbofurano, Lambda cyhalotrina, Bifentrina, ateniéndose a las restricciones propias de esos productos.

**Incompatibilidad:** **SIMANEX® 90 WG** es incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

**Período de Carencia:** No corresponde por el tipo y momento de aplicación.

**Tiempo de Reingreso:** Se recomienda esperar 12 horas para reingresar al área tratada después de realizada la aplicación. El período de resguardo propuesto para el ingreso de personas al sector tratado es de 24 horas mientras que para animales es de 14 días.



**CUIDADO**

