

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Iprodiona pertenece al grupo químico de las dicarboximidias.

Durante la aplicación de **RUKON VIÑAS**, usar respirador con filtro para material particulado, guantes de látex, nitrilo o PVC, antiparras para protección contra partículas, traje completo de protección química y botas de goma. Después de cada aplicación o antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Al terminar la jornada de trabajo, ducharse con abundante agua y jabón.

Síntomas de Intoxicación: Inhalación excesiva del polvo puede producir irritación y tos. Contacto con la piel y los ojos puede producir irritación. Moderadamente tóxico por ingestión; el nivel de daño dependerá de la cantidad ingerida. Se recomienda verificar periódicamente la exposición de los trabajadores, controlando el contenido de desalquil iprodiona en la orina.

Primeros Auxilios: Para todos los casos se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo.

Inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Si el paciente no respira, dar respiración artificial o practicar resucitación cardio-pulmonar y llamar a una ambulancia. Pedir asistencia médica. **Contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán de utilizarse nuevamente, si la irritación persiste, consultar con un especialista. Pedir asistencia médica. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua por 15 a 20 minutos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Llamar a un médico de inmediato. **Ingestión:** No inducir al vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Solo si la persona se encuentra consciente dar un vaso de agua. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Antídoto: No posee.

Tratamiento médico de emergencia: Tratar sintómicamente. **Advertencias para el médico:** No es un inhibidor de la colinesterasa. Todos los tratamientos deberán basarse en los signos y síntomas que presente el paciente. La intoxicación puede ser el resultado de varios productos y rutas de exposición. **RUKON VIÑAS** puede ser el último, pero no necesariamente el único que originó la intoxicación. En caso de inhalación, personas con problemas respiratorios crónicos (asma, bronquitis, etc.) presentarán un cuadro agravado de estas enfermedades. Lo mismo puede ocurrir con la piel.

Información Ecotoxicológica: No es tóxico para organismos acuáticos ni abejas. No se han observado efectos tóxicos en aves, plantas, suelo ni microorganismos del suelo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

A ELIMINACION DE LOS RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

En caso de intoxicación llamar :

RITA: (2) 2777 1994

Rotam de Chile Agroquímica Limitada (2) 2233 9152

Precauciones de Almacenaje: Almacenar con llave, en su envase original, con su respectiva etiqueta, en lugar seguro, fresco y seco, separado de semillas, forrajes y fertilizantes. No almacenar con sólidos inflamables, sustancias comburentes, oxidantes o peróxidos orgánicos.

RUKON VIÑAS

Fungicida

Polvo Seco (DP)

RUKON VIÑAS es un fungicida de contacto con acción preventiva, para el control de pudrición gris producida por *Botrytis cinerea* y pudrición ácida, causada por un complejo de microorganismos que incluyen bacterias, levaduras y hongos indicados en esta etiqueta.

COMPOSICION:

Ingrediente Activo: % p/p (g/kg)

Iprodiona* 5% p/p (50 g/kg)

Coformulantes c.s.p. 100% p/p (1 kg)

*3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioximidazolidina-1-carboximida

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2631

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg.

Fecha Venc.:

FORMULADO POR:

NEW TECH AGRO S.A.
Fundo San José del Boldal
S/N - Quinahue
Santa Cruz - Chile

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Rotam de Chile Agroquímica Ltda.
Providencia 2318 Of 31
Providencia
Santiago - Chile

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

RUKON VIÑAS es un fungicida de contacto con acción preventiva. Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento del micelio del hongo.

Cuadro de Instrucciones de uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	EPOCAS DE APLICACIÓN
Vides de mesa, viníferas y pisqueras	Pudrición gris <i>Botrytis cinerea</i>	18	Aplicar vía espolvoreo a partir de pinta a cosecha. Aplicar dos veces como máximo por temporada, con intervalos de 10 días.
Vides de mesa, viníferas y pisqueras	Pudrición ácida causada por bacterias del grupo <i>Acetobacter</i> , levaduras y los hongos <i>Aspergillus niger</i> , <i>Penicillium expansum</i> , <i>Rhizopus</i> spp, <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Mucor racemus</i> y <i>Botrytis cinerea</i> .	18	Aplicar vía espolvoreo en pinta y pre-cosecha. Aplicar dos veces como máximo por temporada, con intervalos de 10 días.

Precauciones:

El uso continuado y en múltiples tratamientos durante el ciclo de cultivo de ciertos fungicidas puede producir resistencia de las cepas del patógeno que se intenta controlar. Se sugieren no más de dos aplicaciones por temporada y alternar con fungicidas de otras familias químicas.

Preparación del producto: No necesita preparación. Aplicar con un equipo convencional para aplicación de polvos secos, realizando un buen cubrimiento del cultivo.

Compatibilidad: Sólo es compatible con aquellos productos fitosanitarios aplicados en polvo.

Incompatibilidad: Evitar el contacto con productos ácidos y con bases fuertes.

Fitotoxicidad: **RUKON VIÑAS** no es fitotóxico a los cultivos recomendados, cuando se aplica de acuerdo a las instrucciones de uso.

Período de Carencia (días): Vides y parronales: 3 día. Para uva de exportación atenerse a las regulaciones del país de destino.

Tiempo de Reingreso: Las personas y animales no deben ingresar al área tratada antes de 12 horas después de la aplicación.

Nota al Comprador: El fabricante garantiza el porcentaje de ingrediente activo y la calidad de la formulación mientras el producto se mantenga en su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por un almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuada o que no se ajusten a las instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante. La información de esta etiqueta sobre naturaleza y uso producto anula cualquier otra información, ya sea escrita u oral.



CUIDADO

