

TUNDRA PLUS

FUNGICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.828

TUNDRA PLUS, es un fungicida con acción sistémica y de contacto, para uso en forma preventiva y curativa. Para el control de las enfermedades descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

* Mancozeb	64% p/p (640 g/kg)
** Cimoxanilo	8% p/p (80 g/kg)
Coformulantes, c.s.p	100% p/p (1 kg)
* Complejo (polimerico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cínquica	
** 1-[(E)-2-ciano-2-metoxiiminoaceti]-3-etilurea	

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300, Providencia
Santiago - Chile

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa, CHILE

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.

Town South Donghua District, Longyou County ZIP: 324400
ZHEJIANG, CHINA.

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

TUNDRA PLUS, fungicida, cuyo ingrediente activo Mancozeb pertenece al grupo químico de los alquilenbis (ditiocarbamatos) y Cimoxanilo pertenece al grupo químico de las oximas de cianoacetamidas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

TUNDRA PLUS, es prácticamente no tóxico a aves y microcrustáceos acuáticos. Moderadamente tóxico a peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

En todos los casos trasladar al afectado al centro hospitalario más cercano llevando la etiqueta o envase del producto.

Síntomas de intoxicación: Irritación cutánea y ocular. Irritación del sistema gastrointestinal, náusea, vómitos, dolor de cabeza.


<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **TUNDRA PLUS**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

TUNDRA PLUS, es un fungicida con acción sistémica y de contacto, para uso en forma preventiva y curativa.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Tomate	Tizón tardío, Cancro del tallo, Tizón temprano, Alternariosis	1,5-2,0 Kg/ha ó 100-150 g/hL agua	Aplicar con condiciones predisponentes a las enfermedades, después del trasplante y con plantas arraigadas. Al mantenerse las condiciones se puede repetir cada 7-10 días.	10
Papa	Tizón tardío, Tizón temprano	1,5-2,0 Kg/ha ó 100-200 g/hL agua	Aplicar con condiciones predisponentes y una vez las plantas arraigadas de unos 10 cm de altura. Repetir cada 7-10 días si persisten las condiciones favorables.	8
Tabaco	Mildiú, Mancha anillada, Pié negro,	1,5-2,0 Kg/ha ó 150-250 g/hL agua	Aplicar con plantas arraigadas después del trasplante. Se puede repetir a los 5-7 días.	N.C.
Ajo, Cebolla	Mildiú	1,5-2,0 Kg/ha ó 150-250 g/hL de agua.	Aplicar con condiciones favorables a la enfermedad. Se puede repetir si persisten las condiciones, cada 7-10 días.	8
Sandía, Melón, Zapallo, Pepino de ensalada	Mancha foliar, Picada del fruto	1,5-2,0 Kg/ha ó 100-150 g/hL de agua	Aplicar al existir condiciones predisponentes a la enfermedad y repetir cada 7 a 10 días, si persisten las condiciones.	8

N.C.: No corresponde

Instrucciones de uso:

Se puede aplicar 2 a 3 veces en la temporada, pero conviene alternar con otros fungicidas de diferente modo de acción y composición química. Se aplica con condiciones favorables a la enfermedad que se va a controlar.

Utilizar las dosis menores cuando el cultivo presente un menor desarrollo vegetativo y las dosis mayores cuando el cultivo presente su desarrollo vegetativo completo.

Utilizar las concentraciones (g/hL) mayores cuando se presuma una mayor presión de la enfermedad, tanto por antecedentes de la localidad o sector como por mayor persistencia de las condiciones favorables.


Volumen recomendado de aplicación 200 a 800 L de agua/ha según el estado fenológico del cultivo.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua a utilizar, agregar la dosis requerida de **TUNDRA PLUS**. Luego rellenar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo siempre agitación constante. Si se aplica con un coadyuvante, agregar este al final, previamente disuelto en agua.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad: No presenta efectos fitotóxicos, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso: 24 horas para reingresar al sector tratado, para personas y animales.



CUIDADO

